

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021, ukene 29, 30 og 51 i 2022, samt 29 og 30 i 2023.

For uke 2023-47 var det 4324 personer (17 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2023-48 var det kl. 10 6. desember 2023 3733 personer (15 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2023-48 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2023-12-06


Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 48. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelssymptomer
Uke 2023-48




Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 2.2. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 2.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2.4 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 48.


Hoste og feber
Uke 2023-48



Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23637 (63 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 16 prosent (13528) av tilfellene, mens det i 74 prosent (63423) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-48, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-48, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 3.4. Prosentandel av respondenter som siden august 2020 har oppgitt ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2023-12-06

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 772	3 019	63,0
Hoste og feber	4 377	6 044	58,0
Muskel- eller leddsmerter	5 420	6 283	53,7
Feber	7 072	7 784	52,4
Svimmel	2 891	3 034	51,2
Appetittmangel	3 463	3 527	50,5
Brystsmerter	1 660	1 589	48,9
Tungpustet	4 794	4 128	46,3
Hodepine	8 940	7 330	45,1
Røde øyne	1 530	1 173	43,4
Sliten eller utmattet	12 525	9 430	43,0
Hoste	12 100	9 048	42,8
Utslett	626	455	42,1
Diaré	2 140	1 521	41,5
Kvalme eller oppkast	2 038	1 396	40,7
Magesmerter	2 334	1 570	40,2
Rennende nese	12 978	8 656	40,0
Sår hals	11 644	7 458	39,0
Forkjølelsessymptomer	19 169	11 373	37,2
Minst ett symptom	23 947	12 509	34,3

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	19 793	9 236	13,50 (13,24, 13,76)
Kontakt med smittet	12 077	5 376	7,86 (7,66, 8,06)
Eget ønske	15 541	2 904	4,24 (4,09, 4,40)
Arbeidssituasjon	10 086	1 255	1,83 (1,73, 1,94)
Har vært i utlandet	4 401	668	0,98 (0,90, 1,05)
Deltakelse på arrangement	2 232	287	0,58 (0,51, 0,65)
Helseplage	2 162	377	0,55 (0,50, 0,61)
Annet	3 161	285	0,42 (0,37, 0,47)
Anbefalt fra helsepersonell	2 139	181	0,26 (0,23, 0,31)
Skal til utlandet	768	80	0,16 (0,13, 0,20)
Anbefalt fra smittestopp	390	70	0,10 (0,08, 0,13)
Studier eller skolegang	140	27	0,05 (0,04, 0,08)


Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.



Symptomprevalens og testresultat


Basert på det respondentene har rapportert om symptomer, testaktivitet og testresultat kan vi sammenligne forekomsten av enkelte symptomer hos de som fikk påvist koronavirus mens deltavarianten var dominerende med forekomsten av symptomer hos de som fikk påvist koronavirus når omikronvarianten ble dominerende.

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert endret smak- og luktesans i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-48 (periode da omikron-variant var dominerende).




Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert forkjølelsessymptomer i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-48 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-12-06

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert feber i kombinasjon med hoste i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-48 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-12-06