

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 2022-14 var det 7948 personer (25 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2022-15 var det kl. 9 20 april 2022 7097 personer (22 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2022-15 fordelt i Norge.




Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 15. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelssymptomer
Uke 2022-15




Sist oppdatert: 2022-04-20

Figur 2.2. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Sist oppdatert: 2022-04-20

Figur 2.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2.4 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 15.

Hoste og feber
Uke 2022-15




Sist oppdatert: 2022-04-20


Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 23292 (61 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 11 prosent (8018) av tilfellene, mens det i 77 prosent (54519) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.


Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2022-15, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.



Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2022-15, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Figur 3.4. Prosentandel av respondenter som siden august 2020 har oppgitt ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2022-04-20

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 440	1 597	52,6
Hoste og feber	2 979	3 047	50,6
Muskel- eller leddsmerter	4 663	3 425	42,3
Brystsmerter	1 378	946	40,7
Feber	6 074	4 089	40,2
Svimmel	2 552	1 671	39,6
Tungpustet	3 653	2 267	38,3
Appetittmangel	2 865	1 640	36,4
Utslett	488	278	36,3
Røde øyne	1 181	666	36,1
Hodepine	7 811	4 203	35,0
Hoste	9 360	5 002	34,8
Sliten eller utmattet	10 725	5 248	32,9
Rennende nese	11 203	4 963	30,7
Magesmerter	1 956	851	30,3
Diaré	1 798	765	29,8
Kvalme eller oppkast	1 709	723	29,7
Sår hals	10 432	4 322	29,3
Forkjølelsessymptomer	17 029	6 538	27,7

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	19 901	5 225	8,36 (8,14, 8,57)
Kontakt	11 326	4 021	6,43 (6,24, 6,62)
Eget ønske	13 648	1 303	2,08 (1,97, 2,20)
Arbeid	10 762	876	1,40 (1,31, 1,50)
Har vært i utlandet	4 538	258	0,41 (0,36, 0,47)
Deltakelse på arrangement	1 929	120	0,35 (0,29, 0,41)
Helseplage	1 943	171	0,27 (0,23, 0,32)
Annet	3 425	150	0,24 (0,20, 0,28)
Anbefalt fra helsepersonell	2 608	116	0,19 (0,15, 0,22)
Skal til utlandet	593	47	0,14 (0,10, 0,18)
Anbefalt fra Smittestopp	363	60	0,11 (0,09, 0,14)
Studier eller skolegang	126	22	0,06 (0,04, 0,10)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.




Sist oppdatert: 2022-04-20

Symptomprevalens og testresultat


Basert på det respondentene har rapportert om symptomer, testaktivitet og testresultat kan vi sammenligne forekomsten av enkelte symptomer hos de som fikk påvist koronavirus mens deltavarianten var dominerende med forekomsten av symptomer hos de som fikk påvist koronavirus når omikronvarianten ble dominerende.

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert endret smak- og luktesans i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2022-15 (periode da omikron-variant var dominerende).




Sist oppdatert: 2022-04-20

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert forkjølelsessymptomer i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2022-15 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2022-04-20

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert feber i kombinasjon med hoste i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2022-15 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2022-04-20