

## Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021, ukene 29, 30 og 51 i 2022, samt 29 og 30 i 2023.

For uke 2023-36 var det 4439 personer (18 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2023-37 var det kl. 12 20. september 2023 3867 personer (15 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

## Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2023-37 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2023-09-20


Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 37. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelssymptomer  
Uke 2023-37




Sist oppdatert: 2023-09-20

Figur 2.2. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Figur 2.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2.4 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 37.


Hoste og feber  
Uke 2023-37



### Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23610 (63 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 15 prosent (12745) av tilfellene, mens det i 75 prosent (62605) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-09-20

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-37, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-09-20

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-37, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2023-09-20

Figur 3.4. Prosentandel av respondenter som siden august 2020 har oppgitt ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.

Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 717	2 792	61,9
Hoste og feber	4 188	5 647	57,4
Muskel- eller leddsmerter	5 243	5 874	52,8
Feber	6 825	7 259	51,5
Svimmel	2 827	2 839	50,1
Appetittmangel	3 341	3 251	49,3
Brystsmerter	1 610	1 506	48,3
Tungpustet	4 621	3 845	45,4
Hodepine	8 709	6 862	44,1
Hoste	11 676	8 500	42,1
Sliten eller utmattet	12 136	8 818	42,1
Røde øyne	1 494	1 074	41,8
Utslett	615	426	40,9
Diaré	2 094	1 420	40,4
Kvalme eller oppkast	1 994	1 296	39,4
Rennende nese	12 588	8 046	39,0
Magesmerter	2 288	1 461	39,0
Sår hals	11 316	7 029	38,3
Forkjølelsessymptomer	18 615	10 677	36,5
Minst ett symptom	23 309	11 754	33,5


**Begrunnelse for testing**

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	19 318	8 671	12,98 (12,72, 13,23)
Kontakt med smittet	11 927	5 198	7,78 (7,58, 7,98)
Eget ønske	15 247	2 665	3,99 (3,84, 4,14)
Arbeidssituasjon	10 015	1 168	1,75 (1,65, 1,85)
Har vært i utlandet	4 347	624	0,93 (0,86, 1,01)
Deltakelse på arrangement	2 214	266	0,55 (0,49, 0,62)
Helseplage	2 105	336	0,50 (0,45, 0,56)
Annet	3 147	261	0,39 (0,34, 0,44)
Anbefalt fra helsepersonell	2 108	169	0,25 (0,22, 0,29)
Skal til utlandet	759	77	0,16 (0,13, 0,20)
Anbefalt fra smittestopp	390	70	0,10 (0,08, 0,13)
Studier eller skolegang	138	25	0,05 (0,03, 0,08)




Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.



### Symptomprevalens og testresultat


Basert på det respondentene har rapportert om symptomer, testaktivitet og testresultat kan vi sammenligne forekomsten av enkelte symptomer hos de som fikk påvist koronavirus mens deltavarianten var dominerende med forekomsten av symptomer hos de som fikk påvist koronavirus når omikronvarianten ble dominerende.

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert endret smak- og luktesans i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-37 (periode da omikron-variant var dominerende).




Sist oppdatert: 2023-09-20

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert forkjølelsessymptomer i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-37 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-09-20

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert feber i kombinasjon med hoste i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-37 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-09-20