

# Koronavaksinasjonsprogrammets utvikling

Oppdatert 03.01.2023

De første dosene i det norske koronavaksinasjonsprogrammet ble satt 27. desember 2020, og det har siden oppstart av programmet og frem til 17. april blitt administrert rundt 11 millioner doser i kommuner og helseforetak.


Det har vært flere utvidelser, tillegg og endringer i anbefalinger og prioriteringer underveis basert på tilgang på koronavaksiner, endringer i den epidemiologiske situasjonen og økende kunnskap om koronavaksinasjon og andre smitteverntiltak.

Før det gjøres endringer i vaksinasjonsanbefalingene i koronavaksinasjonsprogrammet utfører Folkehelseinstituttet en grundig utredning med en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Utredningen inkluderer blant annet:


- En vurdering av smittesituasjon og sykdomsbyrde
- En vurdering av nytten av den aktuelle endringen inkludert forventet immunrespons, vaksineeffekt og sikkerhet.
- En vurdering av gjennomførbarhet av endringen inkludert tilgang på vaksiner og kapasitet i kommunene til å gjennomføre vaksinasjon

Ved større endringer i vaksinasjonsprogrammet konsulteres [Faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram](#). Folkehelseinstituttet innhenter også innspill fra relevante kliniske fagmiljøer ved behov.

Basert på det faglige kunnskapsgrunnlaget utarbeider Folkehelseinstituttet sin anbefaling for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som beslutter hvilke endringer i koronavaksinasjonsprogrammet som skal innføres, og Folkehelseinstituttet er ansvarlig for implementering.



Figur 1. Illustrasjon over godkjente vaksiner og andre milepæler i koronavaksinasjonsprogrammet. (Klikk på bildet for forstørrelse) Folkehelseinstituttet



Figur 2. Illustrasjon over prioriteringer, anbefalinger og vaksinasjonstilbud. (Klikk på bildet for forstørrelse) Folkehelseinstituttet

## Tidslinje – Koronavaksinasjonsanbefalinger

| Dato       | Anbefaling  |
|------------|---|
| 21.12.2020 | <a href="#">Comirnaty betinget godkjenning for 16 år+</a> |

| Dato       | Anbefaling  |
|------------|---|
| 21.12.2020 | <u>Anbefaling for beboere i sykehjem og omsorgsboliger, personer 65 år og eldre, og personer i riskogruppe 18-65 år</u>   |
| 06.01.2021 | <u>Spikevax betinget godkjenning for 18 år+</u>   |
| 11.01.2021 | <u>20 % av dosene til prioritert helsepersonell i kommunene</u>   |
| 15.01.2021 | <u>Personer 45-64 år anbefales vaksine</u>  |
| 29.01.2021 | <u>Vaxzevria betinget godkjenning for 18 år+</u>  |
| 08.02.2021 | <u>Vaxzevria anbefales til personer under 65 år inkludert helsepersonell</u>  |
| 08.02.2021 | <u>Ungdom 16-17 år med alvorlig grunnsykdom anbefales 2 doser Comirnaty.</u>  |
| 22.02.2021 | <u>Fra uke 8 skal kun Vaxzevria gis til helsepersonell under 65 år (mRNA om man har underliggende sykdom)</u>   |
| 09.03.2021 | <u>FHI vedtar at intervallet mellom 1. og 2. dose kan forlenges til 6 uker</u>  |
| 10.03.2021 | <u>Vaxzevria blir tilbudt til personer over 65 år</u>   |
| 10.03.2021 | <u>Gjennomgått infeksjon erstatter en vaksinedose</u>   |
| 11.03.2021 | <u>Janssen-vaksinen betinget godkjenning for 18 år+</u>   |
| 12.03.2021 | <u>Vaxzevria settes på pause</u>  |
| 23.04.2021 | <u>Personer som har fått 1 dose Vaxzevria vil få tilbud om videre vaksinerings med mRNA-vaksine</u>   |
| 30.04.2021 | <u>Intervallet mellom 1. og 2. dose av mRNA-vaksiner økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra FHI. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer</u> |
| 04.05.2021 | <u>Gravide utenfor risikogrupper som bor i områder med høy smittespredning kan i samråd med lege vurdere vaksinasjon i 2. og 3.trimester</u>  |
| 09.05.2021 | <u>FHI anbefaler at Janssen-vaksinen ikke skal tas i bruk i det norske koronavaksinasjonsprogrammet</u>   |

| Dato       | Anbefaling  |
|------------|---|
| 12.05.2021 | <a href="#"><u>Vaxzevria blir tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet</u></a>   |
| 21.05.2021 | <a href="#"><u>Personer 18-44 år uten risikofaktorer anbefales vaksinasjon</u></a>  |
| 28.05.2021 | <a href="#"><u>Godkjenning Comirnaty utvidet til 12-15 år</u></a>   |
| 07.06.2021 | <a href="#"><u>Endring av doseintervall fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft fra uke 20</u></a>                                     |
| 15.06.2021 | <a href="#"><u>Janssen-vaksinen blir tilbudt utenfor koronavaksinasjonsprogrammet</u></a>   |
| 15.06.2021 | <a href="#"><u>Barn 12- 15 år med alvorlig underliggende sykdom anbefales 2 doser Comirnaty</u></a>   |
| 24.06.2021 | <a href="#"><u>Det åpnes for kombinerings av mRNA-vaksiner</u></a>  |
| 23.07.2021 | <a href="#"><u>Godkjenning for Spikevax utvidet til 12-17 år</u></a>  |
| 18.08.2021 | <a href="#"><u>Gravide anbefales fullvaksinasjon med mRNA- vaksine i svangerskapet, i 2. og 3. trimester</u></a>                            |
| 18.08.2021 | <a href="#"><u>Ungdom 16-17 år anbefales mRNA- vaksine, med intervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2</u></a>                               |
| 30.08.2021 | <a href="#"><u>Immunsupprimerte 18 år+ anbefales en 3.dose i grunnvaksinasjon</u></a>   |
| 02.09.2021 | <a href="#"><u>Barn 12-15 år tilbys 1 dose Comirnaty</u></a>  |
| 21.09.2021 | <a href="#"><u>Immunsupprimerte 12-17 år kan i samråd med lege vurderes for 3.dose i grunnvaksinasjon</u></a>                               |
| 01.10.2021 | <a href="#"><u>Ungdom 16-17 år anbefales 2 doser Comirnaty med 12 ukers intervall mellom dose 1 og 2 (FHI foretatt en ny vurdering)</u></a> |
| 04.10.2021 | <a href="#"><u>Comirnaty og Spikevax er godkjent for 3.dose til immunsupprimerte, og Comirnaty som boosterdose</u></a>                      |
| 05.10.2021 | <a href="#"><u>Janssen-vaksinerte tilbys en ekstra dose mRNA-vaksine</u></a>  |
| 05.10.2021 | <a href="#"><u>Sykehjemsbeboere og eldre 65 år+ anbefales en oppfriskingsdose</u></a>   |

| Dato       | Anbefaling   |
|------------|--|
| 06.10.2021 | <a href="#">FHI tydeliggjør rådet at Spikevax ikke skal bli gitt til de under 18 år, samt at menn under 30 år bør vurdere å velge Comirnaty, som et føre var-prinsipp</a>  |
| 25.10.2021 | <a href="#">Boosterdose godkjent for Spikevax</a>  |
| 04.11.2021 | <a href="#">Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, anbefales oppfriskningsdose</a>   |
| 25.11.2021 | <a href="#">Godkjenning Comirnaty utvidet til 5-11 år (barnedose 10 µg)</a>  |
| 26.11.2021 | <a href="#">Personer 45-64 år anbefales oppfriskningsdose. Personer 18-44 kan ta oppfriskningsdose</a>   |
| 26.11.2021 | <a href="#">Alle ansatte i heletjenesten anbefales oppfriskningsdose</a>   |
| 15.12.2021 | <a href="#">Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom kan vaksineres med Comirnaty (barnedose 10 µg)</a>   |
| 20.12.2021 | <a href="#">Nuvaxovid betinget godkjenning for 18 år+</a>  |
| 20.12.2021 | <a href="#">Gravide i 2. og 3. trimester prioriteres for oppfriskningsdose hvor det har gått 4,5 mnd. etter dose 2, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom</a>   |
| 11.01.2022 | <a href="#">FHI anbefaler at også kvinner under 30 år velger Comirnaty fremfor Spikevax</a>  |
| 14.01.2022 | <a href="#">Barn 5-11 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser Comirnaty (barnedose 10 µg)</a>  |
| 14.01.2022 | <a href="#">Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres med 2 doser Comirnaty (barnedose 10 µg)</a>   |
| 14.01.2022 | <a href="#">Barn 12-15 år kan vaksineres med 2 doser Comirnaty</a>   |
| 21.01.2022 | <a href="#">Janssen-vaksinen er ikke lengre tilgjengelig. Norge vil ikke motta flere doser av vaksinen og den er ikke lengre mulig å bestille fra FHI</a>  |
| 21.01.2022 | <a href="#">Personer vaksinert med Janssen-vaksine + mRNA-vaksine, anbefales å følge de samme rådene rundt oppfriskningsdose som de som har mottatt to doser mRNA-vaksine eller en kombinasjon av Vaxzevria + mRNA-vaksine</a> |

| Dato       | Anbefaling  |
|------------|---|
| 25.01.2022 | <a href="#"><u>Immunsupprimerte anbefales oppfriskningsdose (4.dose) 3 mnd. etter dose 3</u></a>  |
| 31.01.2022 | <a href="#"><u>Comirnaty godkjent for bruk av 3 doser som grunnvaksinasjon for barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar (5-11 år med barnedose 10 µg)</u></a> |
| 31.01.2022 | <a href="#"><u>Alle gravide anbefales grunnvaksinasjon, uavhengig av trimester, + oppfriskningsdose om det har gått mer enn 20 uker siden dose 2</u></a>            |
| 07.03.2022 | <a href="#"><u>Nuvaxovid kan benyttes til vaksinasjon av personer 18 + som av ulike grunner ikke vil/kan ta mRNA-vaksine</u></a>                                    |
| 20.04.2022 | <a href="#"><u>Personer som er 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, får tilbud om en oppfriskningsdose.</u></a>    |
| 05.08.2022 | <a href="#"><u>Oppstart av vaksinasjon fra aldersgruppen 65-74</u></a>  |
| 12.09.2022 | <a href="#"><u>Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine</u></a>  |
| 18.11.2022 | <a href="#"><u>Mulighet for flere til å ta ny oppfriskningsdose</u></a>   |