

Vaksine mot pneumokokksjukdom

Pneumokokk er ein bakterie som kan gi lungebetennelse, øyrebetennelse eller biholebetennelse, men og alvorleg sjukdom som blodforgifting eller hjernehinnebetennelse som mange dør av.



Ta vaksine dersom du:

- Er 65 år eller eldre
- Har sjukdom som gir immunsvikt
- Brukar medisin som svekker immunforsvaret
- Har sjukdomar eller andre tilstandar som gir auka risiko

Kva vaksiner har eg tatt?

Lurer du på kva slags vaksiner du har tatt, eller kor lenge det er sidan?

Opplysningsane finn du på:



Les meir på
fhi.no/voksenvaksinasjon

Kvífor skal eg vaksinere meg?

De fleste som får alvorleg pneumokokksjukdom blir innlagde på sjukehus, og dødstala er høge. Pneumokokkbakterien finn ein i nase og svelg, særleg hjå friske born. Smitte skjer via drope-smitte, som hoste, nysing og liknande.

De fleste blir ikkje sjuke, men nokre har større risiko for å få alvorleg pneumokokksjukdom. Vaksinen er det beste du kan gjere for å beskytte deg sjølv.

Fire ulike pneumokokkvaksiner er tilgjengeleg. Alle vaksinane gir god beskyttelse – legen din vil gi råd om kva for ein som er best for deg.

Kor ofte bør eg vaksinere meg?

Vaksinane har god effekt. Oftast er det anbefalt ei ny dose pneumokokkvaksine kvart 6. år, men behovet for påfyll varierer etter kva vaksine du tek.

Kan eg ta pneumokokkvaksine samtidig med andre vaksiner?

Pneumokokk-, korona- og influensavaksine kan gjevast samtidig. Hugs: ein skal ikkje ta pneumokokkvaksine kvart år.

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinen kan gje at du kan få ein hevselse og bli sår og raud på stikkstaden, i tillegg til feber. Allergiske reaksjonar eller andre alvorlege biverknadar er sjeldne.

Kor kan eg ta pneumokokkvaksine?

Sjekk med legen din, eller på nettsidene til kommunen, om kor du kan vaksinere deg.

Særskilte risikogrupper kan få vaksinen gratis på blå resept, men dei fleste må betale. Er du utsett for sjukdom gjennom jobb skal arbeidsgivar dekke dette.