

Fornavn/etternavn:
Gateadresse:
Postnr./poststed:

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

Har du hatt infeksjon i operasjonssåret?

Sykehuset undersøker rutinemessig hvor mange pasienter som får infeksjon i operasjonssåret etter utskrivelse/behandling ved vårt sykehus. Vi er svært takknemlige hvis du svarer på følgende spørsmål når det har gått 30 dager etter operasjonen. Skjemaet returneres i den vedlagte konvolutten, også om du ikke har hatt tegn til infeksjon.

Har det kommet gulgrønn sårveske (puss) fra operasjonssåret?

☐ Ja ☐ Nei

Har det vært unormal rødme rundt operasjonssåret (mer enn ½ cm på hver side)?

☐ Ja ☐ Nei

Har lege åpnet operasjonssåret på grunn av infeksjon?

☐ Ja ☐ Nei

Har du fått antibiotika på grunn av betennelse i operasjonssåret?

☐ Ja ☐ Nei

Har du hatt feber (mer enn 38,5 grader) på grunn av betennelse i operasjonssåret?

☐ Ja ☐ Nei

Dato når du evt. oppdaget infeksjonstegn:

Dato/underskrift

--

Har du svart "ja" på ett av spørsmålene, tyder det på at du har hatt en infeksjon i operasjonssåret. Vi ber deg da om å kontakte din lege og medbringe dette brevet. Legen skal fylle ut spørsmålene på side 2 før du sender brevet tilbake til oss i den vedlagte konvolutten. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

Har du spørsmål knyttet til denne henvendelsen kan du kontakte undertegnede.

Vennlig hilsen

VEND

Side 2**Utfylles av lege**

Pasienten har / har hatt en overflatisk postoperativ sårinfeksjon	☐ Ja	☐ Nei
Pasienten har / har hatt en dyp postoperativ sårinfeksjon	☐ Ja	☐ Nei
Pasienten har / har hatt en postoperativ infeksjon i organ/hulrom	☐ Ja	☐ Nei
Infeksjon ble oppdaget (dato)		
Bakteriologisk prøve:	☐ Ikke tatt	☐ Ingen vekst
Vekst av:		Dato for prøvetaking:

Evt. klinisk vurdering:

Underskrift, dato og stempel**INFEKSJON I OPERASJONSOMRÅDET**

Kasusdefinisjon utarbeidet av European Center for Disease Prevention and Control

Overfladisk postoperativ sårinfeksjon

Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjon

OG

infeksjonen omfatter kun hud og subkutant vev omkring snittet

OG

minst ett av de følgende:

- Purulent sekresjon fra det overflatiske snittet, laboratoriebekreftet eller ikke
- Isolering av mikroorganismer ved dyrking av væske eller vev fra det overfladiske snittet, i prøve tatt ved aseptisk teknikk
- Minst ett av følgende tegn eller symptomer på infeksjon: smerte eller ømhet, lokal hevelse, rødhet, varme OG det overflatiske snittet med hensikt er åpnet av kirurg, med mindre dyrking fra såret er negativ
- En kirurg eller behandlende lege har stilt diagnosen overflatisk postoperativ sårinfeksjon

Dyp postoperativ sårinfeksjon

Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjon uten innsetting av implantat, eller innen ett år etter operasjon med innsetting av implantat

OG

infeksjonen synes å være relatert til operasjonen

OG

infeksjonen omfatter dypt bløtvev (for eksempel fascie, muskel) omkring snittet

OG

minst ett av de følgende:

- Purulent sekresjon fra det dype snittet, men ikke fra organ/hulromdelen av operasjonsområdet
- Et dypt snitt åpner seg spontant eller åpnes med hensikt av kirurg når pasienten har minst ett av følgende tegn eller symptomer: feber (>38 °C), lokal smerte eller ømhet, med mindre snittet er dyrkingsnegativt
- En abscess eller andre tegn på infeksjon som omfatter det dype snittet blir påvist ved direkte undersøkelse, under reoperasjon eller ved histopatologisk eller radiologisk undersøkelse
- En kirurg eller behandlende lege har stilt diagnosen dyp postoperativ sårinfeksjon

Postoperativ infeksjon i organ/hulrom

Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjon uten innsetting av implantat, eller innen ett år etter operasjon med innsetting av implantat

OG

infeksjonen synes å være relatert til operasjonen

OG

infeksjonen omfatter andre deler av kroppen (for eksempel organer og hulrom) enn snittet, som ble åpnet eller manipulert under en operasjon

OG

minst ett av de følgende:

- Purulent sekresjon fra et dren lagt inn med separat innstikkssted i organet/hulrommet
- Isolering av mikroorganismer ved dyrking av væske eller vev fra organet/hulrommet, i prøve tatt ved aseptisk teknikk
- En abscess eller andre tegn på infeksjon som omfatter organet/hulrommet blir påvist ved direkte undersøkelse, under reoperasjon eller ved histopatologisk eller radiologisk undersøkelse
- En kirurg eller behandlende lege har stilt diagnosen postoperativ infeksjon i organ/hulrom